

Cook Children's


Depto. de Neurocirugía

682-885-2500

Doctor: _____

El Cráneo

Sostiene y protege nuestro cerebro



Medical Illustration(s) © 2019 Nucleus Medical Media, Inc.

Tipos de Fracturas de Cráneo

| | |
|----------------------------------|--|
| Lineal | El tipo más común de fracturas en niños. Pueden ser fracturas simples o múltiples que involucran todo el grosor del cráneo. |
| Conminuta | Múltiples fracturas lineales conectadas. |
| Hundida | Empujada hacia adentro y se puede asociar con un trauma en el cerebro debajo de la fractura. |
| Abierta | Piel sobre fractura con laceración o abrasión de espesor completo. |
| Basilar (base del cráneo) | Las fracturas que pueden alterar los huesos de los senos paranasales o del oído medio pueden tener una fuga asociada de líquido cefalorraquídeo (LCR) de la nariz o de las orejas. |

Por favor, recuerde

1. Cada niño es diferente. Su hijo puede tardar más tiempo en sanar que otro niño.
2. Siempre es importante llamar a la clínica si tiene alguna pregunta o preocupación.

Fracturas de cráneo pediátricas

Diagnóstico de una fractura de cráneo

El equipo médico puede ordenar una radiografía o una tomografía computarizada. Ambas pueden evaluar una fractura. A veces se necesita una exploración adicional para identificar lesiones detrás de la fractura.



Fractura de cráneo occipital lineal derecha

Medical Illustration(s) © 2019 Nucleus Medical Media, Inc.

Tratamiento de fracturas de Cráneo

Generalmente, las fracturas de cráneo no necesitan ningún tipo de tratamiento especial. Las fracturas lineales de cráneo se curan por sí solas y no requieren tratamiento específico del equipo de cirugía.

Las fracturas de cráneo de Basilar, con una fuga asociada de líquido LCR, requerirán un tratamiento especial. Es importante que su hijo sea hospitalizado y monitoreado hasta que el LCR deje de filtrarse por la nariz o los oídos.

Cuidado de seguimiento

Hinchazón alrededor del área de la fractura

Frecuente en niños con fracturas de cráneo. A menudo alcanza su punto máximo de 3 a 7 días después de la lesión. La hinchazón puede tardar de 4 a 6 semanas en desaparecer.

Actividad

El equipo de Neurocirugía limitará la actividad de su hijo durante la recuperación. La prevención más importante: evitar que su hijo se caiga y se golpee la cabeza mientras se cura.

Medicamentos para el dolor

Su hijo puede tener alguna molestia después de la fractura. Su equipo generalmente recomendará medicamentos de venta libre para el malestar.

Repetición de exámenes de imágenes

No es necesario repetir radiografías o tomografías computarizadas en la mayoría de los niños con fracturas de cráneo. Las fracturas lineales de cráneo se curan con el tiempo y no requieren repetición de exámenes de imágenes.

Recuperación

La mayoría de los niños se recuperarán completamente sin complicaciones después de una fractura de cráneo. Generalmente no hay daño de largo plazo al cerebro.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hableles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.